

Exercice 1

- 1. On considère la fonction g définie sur $I = [0 ; 10]$ par $g(t) = \frac{t+6}{2t+1}$.
- Justifier que g est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $g'(t)$ pour tout $t \in [0 ; 10]$.
 - En déduire le sens de variations de g sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de p définie par $p(x) = 2x^3 - 6x^2 + 6x + 7$ sur $[-10 ; 10]$.

Exercice 2

- 1. On considère la fonction k définie sur $I = [-10 ; 8]$ par $k(t) = \frac{2t+8}{t-9}$.
- Justifier que k est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $k'(t)$ pour tout $t \in [-10 ; 8]$.
 - En déduire le sens de variations de k sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de f définie par $f(x) = x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 1$ sur $[-10 ; 10]$.

Exercice 3

- 1. On considère la fonction k définie sur $I = [-10 ; 1]$ par $k(t) = \frac{2t-7}{4t-6}$.
- Justifier que k est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $k'(t)$ pour tout $t \in [-10 ; 1]$.
 - En déduire le sens de variations de k sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de h définie par $h(x) = 2x^3 - 27x^2 + 48x + 10$ sur $[-10 ; 10]$.

Exercice 4

- 1. On considère la fonction h définie sur $I = [-10 ; -1]$ par $h(t) = \frac{-t-8}{-2t+1}$.
- Justifier que h est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $h'(t)$ pour tout $t \in [-10 ; -1]$.
 - En déduire le sens de variations de h sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de p définie par $p(x) = x^3 + 3x^2 - 72x - 5$ sur $[-10 ; 10]$.

Exercice 5

- 1. On considère la fonction h définie sur $I = [-10 ; 2]$ par $h(t) = \frac{5t-4}{3t-7}$.
- Justifier que h est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $h'(t)$ pour tout $t \in [-10 ; 2]$.
 - En déduire le sens de variations de h sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de k définie par $k(x) = x^3 - \frac{27}{2}x^2 + 60x + 2$ sur $[-10 ; 10]$.