

Exercice 1

- 1. On considère la fonction h définie sur $I = [-1 ; 10]$ par $h(t) = \frac{t+6}{-2t-5}$.
- Justifier que h est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $h'(t)$ pour tout $t \in [-1 ; 10]$.
 - En déduire le sens de variations de h sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de h définie par $h(x) = x^3 + 15x^2 + 63x - 7$ sur $[-10 ; 10]$.

Exercice 2

- 1. On considère la fonction h définie sur $I = [0 ; 10]$ par $h(t) = \frac{2t-4}{-4t-5}$.
- Justifier que h est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $h'(t)$ pour tout $t \in [0 ; 10]$.
 - En déduire le sens de variations de h sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de p définie par $p(x) = 3x^3 - \frac{45}{2}x^2 - 126x - 6$ sur $[-10 ; 10]$.

Exercice 3

- 1. On considère la fonction h définie sur $I = [-3 ; 10]$ par $h(x) = \frac{-2x+6}{-2x-8}$.
- Justifier que h est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $h'(x)$ pour tout $x \in [-3 ; 10]$.
 - En déduire le sens de variations de h sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de q définie par $q(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x - 5$ sur $[-10 ; 10]$.

Exercice 4

- 1. On considère la fonction g définie sur $I = [-1 ; 10]$ par $g(t) = \frac{-5t+5}{3t+5}$.
- Justifier que g est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $g'(t)$ pour tout $t \in [-1 ; 10]$.
 - En déduire le sens de variations de g sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de g définie par $g(x) = 2x^3 - 30x^2 + 144x - 4$ sur $[-10 ; 10]$.

Exercice 5

- 1. On considère la fonction g définie sur $I = [-10 ; 0]$ par $g(t) = \frac{-2t+7}{-3t+3}$.
- Justifier que g est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $g'(t)$ pour tout $t \in [-10 ; 0]$.
 - En déduire le sens de variations de g sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de k définie par $k(x) = 3x^3 + 9x^2 - 135x + 10$ sur $[-10 ; 10]$.