

Exercice 1

- 1. On considère la fonction h définie sur $I = [-10 ; 8]$ par $h(x) = \frac{-x + 2}{-x + 9}$.
- Justifier que h est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $h'(x)$ pour tout $x \in [-10 ; 8]$.
 - En déduire le sens de variations de h sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de g définie par $g(x) = 2x^3 + 33x^2 + 108x - 4$ sur $[-10 ; 10]$.

Exercice 2

- 1. On considère la fonction f définie sur $I = [-10 ; 7]$ par $f(x) = \frac{-2x - 6}{x - 8}$.
- Justifier que f est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $f'(x)$ pour tout $x \in [-10 ; 7]$.
 - En déduire le sens de variations de f sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de p définie par $p(x) = x^3 - 18x^2 + 96x$ sur $[-10 ; 10]$.

Exercice 3

- 1. On considère la fonction k définie sur $I = [-3 ; 10]$ par $k(x) = \frac{x - 4}{-x - 4}$.
- Justifier que k est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $k'(x)$ pour tout $x \in [-3 ; 10]$.
 - En déduire le sens de variations de k sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de g définie par $g(x) = x^3 - \frac{21}{2}x^2 + 30x + 3$ sur $[-10 ; 10]$.

Exercice 4

- 1. On considère la fonction h définie sur $I = [-10 ; 6]$ par $h(x) = \frac{5x - 3}{x - 7}$.
- Justifier que h est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $h'(x)$ pour tout $x \in [-10 ; 6]$.
 - En déduire le sens de variations de h sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de h définie par $h(x) = 2x^3 + 27x^2 + 48x$ sur $[-10 ; 10]$.

Exercice 5

- 1. On considère la fonction h définie sur $I = [0 ; 10]$ par $h(x) = \frac{-x + 1}{-3x - 5}$.
- Justifier que h est définie et dérivable sur I .
 - Déterminer $h'(x)$ pour tout $x \in [0 ; 10]$.
 - En déduire le sens de variations de h sur I .
- 2. Étudier le sens de variations de p définie par $p(x) = x^3 - 15x^2 + 63x - 1$ sur $[-10 ; 10]$.